



REACCIONES A LA VACUNACION (Y PICADURAS DE INSECTOS)

Tu mascota ha recibido una ó mas vacunas para protegerlo de serias y fatales enfermedades. Aunque las vacunas son seguras y efectivas, ocasionalmente mascotas (y personas) pueden desarrollar reacciones a la vacuna. Si su mascota nunca ha tenido reacciones a las vacunas anteriormente (ó una reacción a una picado de insecto), no se puede pronosticar si su mascota tendrá una reacción. Pero hay algunas razas de perros que son más propensas a las reacciones de vacunas—Dachshunds, Pugs, Schnauzers, Miniature Pinschers, Yorkies, and Chihuahuas. Como se puede ver, las razas de perros pequeñas son más propensas a las reacciones que las razas de perros grandes.

SUGERENCIAS PARA PERROS SOLAMENTE:

- (1) **Dolor en los perros:** Si su perro está experimentando dolor ó malestar después de las vacunas, usted puede darle **Children's Aspirin (81mg)** una dosis por cada 15lbs de peso. Puedes darle la dosis cada 12 horas si es necesario.
- (2) **Vómitos/Diarrea en perros:** (No es común con vacunas, pero es común en un viaje en carro/estress) Darle una cucharadita de **Liquid PeptoBismol** por cada 10 a 20 lbs de peso.
- (3) **Inflamación de cara/orejas...** multiple nudos elevado en la piel en perros: Para perros más pequeños, da una tableta de **Children's Chewable Benadryl (12.5mg)** por cada 10-15lbs de peso. Para perros más grandes, da una tableta de **Adult Chewable Benadryl (25mg)** por cada 25lbs de peso.

Las dos causas más comunes de reacciones a las vacunas de PERROS son:

- (1) Vacuna contra la rabia
- (2) El componente de *leptospirosis* de la vacuna de *moquillo canino* (Distemper-Parvo). Afortunadamente, nosotros tenemos la vacuna contra el *moquillo canino* (Distemper-Parvo) sin *leptospirosis* y usted puede pedir esta vacuna si es necesario para su perro.

Las dos causas más comunes de reacciones a las vacunas de GATOS son:

- (1) Vacuna contra la rabia
- (2) Vacuna contra la leucemia—puede causar decaimiento por 12 a 24 horas.

LEVE REACCIONES A LAS VACUNAS: Cuando su mascota tiene reacciones leve una o más de las siguientes condiciones pueden pasar: decaimiento leve, destemplanza, dolencia (especialmente a donde fue puesta la vacuna y mas cuando reciben la vacuna contra el *leptospirosis* solamente), poco el apetito, dolor de estómago con vomito y diarrea (no es común).

Estas leves reacciones raramente duran más de 12 a 24 horas. Usted puede llamarnos ó llamar a su veterinario de emergencia local. Si usted observa algunos de estos síntomas, normalmente pueden ser controlados en casa con las sugerencias mencionadas antes. Otras sugerencias importantes son:

- Para perros experimentando vomito ó diarrea, no le de alimentos por lo menos por 6 horas. Dele trozos de hielo para que lame por aproximadamente 2 horas. Es importante que sepa que **PeptoBismol** puede causar que el excremento cambia de color (negro).
- **NUNCA le de Aspirin (o otras formas de medicinas humanas para aliviar dolor) a los GATOS**
- También, no le de Tylenol ó Ibuprofen ó otra forma de Aspirin

Si estas condiciones duran mas de 24 horas, por favor llame a su veterinario local ó una clinica de emergencia.

MAS SERIAS REACCIONES A LAS VACUNAS: Raramente, mascotas pueden experimentar reacciones mas serias que pueden empezar de enseguida o hasta varias horas después de haber recibido las vacunas. Los síntomas mas comunes son: inflamación de la cara/orejas, erupción ó picazon severa, dificultad al respirar (especialmente con los "sin nariz/no nose" razas como los Pugs, Pekingeses, etc.)

***Si su mascota muestra algunos de estos síntomas, debe ir al veterinario (especialmente si estan experimentando dificultad al respirar). Si esto no es posible, puedes usar tratamientos en casa como **Benadryl ó Benadryl genérico**. Benadryl viene en paquete de tabletas de 25mg. **Children's Benadryl** viene en paquete de tabletas de 12.5mg. No le de **Benedryl** con otros ingredientes activos—solamente Benadryl simple. Si su mascota tiene inflamación y erupción, puede tomar varias horas para que le baje la inflamación.

- Los perros no absorben Benadryl muy bien, por este hecho necesitan una dosis mas alta que las personas.
- En ocasiones, las mascotas que han recibido inyecciones pueden desarrollar una reacción localizada debajo de la piel que aparecen pequeños abultamientos. Puede tomar varias semanas para que los abultamiento aparezcan y puede tomar de 6 a 8 semanas hasta que desaparezcan.
- La vacuna contra la tos canina (Bordetella) algunas veces es dada por la nariz que puede provocar estornudos leves de 1-2 días.